arXiv:math/9807030v1 [math.AG] 7 Jul 1998

Structures de Contact sur les Variétés Toriques

Stéphane DRUEL
DMI-École Normale Supérieure
45 rue d'Ulm
75005 PARIS
e-mail : druel@clipper.ens.fr

§1 Introduction

Une *structure de contact* sur une variété algébrique lisse est la donnée d'un sous-fibré $D \subset \mathcal{T}_X$ de rang $\dim X - 1$ de sorte que la forme $\mathcal{O}_X$-bilinéaire sur D à valeurs dans le fibré en droites $L = \mathcal{T}_X/D$ déduite du crochet de Lie sur $\mathcal{T}_X$ soit non dégénérée en tout point de X. Cela entraîne que X est de dimension impaire $2n+1$ et que le fibré canonique K_X est isomorphe à L^{-1-n}. On peut aussi définir la structure de contact par la donnée d'un élément $\theta \in H^0(X, \Omega^1_X \otimes L)$, la *forme de contact*, tel que $\theta \wedge (d\theta)^n$ soit partout non nul.

Les espaces projectifs complexes et les variétés $\mathbb{P}_Y(\mathcal{T}_Y)$, où Y est une variété lisse, sont des exemples de variétés de contact.

En quelques mots, une *variété torique* est une compactification équivariante d'un tore ([D], [O], [F]).

L'étude des variétés de contact se révèle difficile. En dimension 3, elles ont été classifées par Y-G.Ye ([Y]) en utilisant la théorie de Mori. D'autres auteurs étudient les structures de contact sur les variétés de Fano ([B], [L]), mais les résultats ne sont ici encore que partiels.

Le résultat principal de ce travail est le

Théorème *Soit X une variété torique projective lisse de dimension $2n+1$ ($n \geq 1$), définie sur le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes et munie d'une structure de contact.*

Alors X est soit isomorphe à l'espace projectif complexe $\mathbb{P}^{2n+1}$, soit isomorphe à la variété $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1 \times \cdots \times \mathbb{P}^1}(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^1 \times \cdots \times \mathbb{P}^1})$.

Remerciements : je tiens à exprimer toute ma gratitude à A.Beauville pour m'avoir soumis ce problème et pour l'aide qu'il m'a apporté.

§2 Rappels et notations

Soit X une variété projective lisse sur le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. Le produit d'intersection entre 1-cycles et diviseurs met en dualité les deux espaces vectoriels réels :

$$N_1(X) = (\{\text{1-cycles}\}/\equiv) \otimes \mathbb{R} \text{ et } N^1(X) = (\{\text{diviseurs}\}/\equiv) \otimes \mathbb{R},$$

où $\equiv$ désigne l'équivalence numérique. La dimension commune de ces espaces vectoriels est

appelée le *nombre de Picard* de X. On considère le cône $NE(X) \subset N_1(X)$ engendré par les classes des 1-cycles effectifs. Une *raie extrémale* est une demi-droite R dans $\overline{NE}(X)$, adhérence de $NE(X)$ dans $N_1(X)$, vérifiant $K_X.R^* < 0$ et telle que pour tout $Z_1, Z_2 \in \overline{NE}(X)$, si $Z_1 + Z_2 \in R$ alors $Z_1, Z_2 \in R$ ([M]). Une *courbe rationnelle extrémale* est une courbe rationnelle irréductible C telle que $\mathbb{R}^+[C]$ soit une raie extrémale et $-K_X.C \leq \mathrm{dim}X + 1$. Le premier résultat de la théorie de Mori est que *toute raie extrémale est engendrée par une courbe rationnelle extrémale.* Le second résultat fondamental est que *toute raie extémale R admet une contraction*, c'est-à-dire qu'il existe une variété projective normale Y et un morphisme $X \stackrel{\phi}{\longrightarrow} Y$, surjectif à fibres connexes, contractant les courbes irréductibles C telles que $[C] \in R$ (théorème de Kawamata-Shokurov).

Dans le cas des variétés toriques, nous avons un résultat plus précis ([R]). Soit X une variété torique projective lisse associée à l'éventail Δ. Nous utilisons les notations de T.Oda ([O2]). Il existe alors des éléments $\tau_1, \ldots, \tau_s \in \Delta(d-1)$ tels que :

$$NE(X) = \overline{NE}(X) = \mathbb{R}^+[V(\tau_1)] + \ldots + \mathbb{R}^+[V(\tau_s)].$$

Les demi-droites $\mathbb{R}^+[V(\tau_i)]$ sont appelées *raies extrémales généralisées.* Soit $R \subset NE(X)$ une raie extrémale généralisée. Alors il existe une variété torique projective Y et un morphisme équivariant $X \stackrel{\phi}{\longrightarrow} Y$ qui soit une contraction au sens de Mori. Notons $A \subset X$ le lieu exceptionnel de ϕ et $B = \phi(X)$:

$$\begin{array}{ccc} X & \stackrel{\phi}{\longrightarrow} & Y \\ \cup & & \cup \\ A & \stackrel{\phi_{|A}}{\longrightarrow} & B \end{array}$$

Alors A et B sont deux strates toriques irréductibles et le morphisme $A \stackrel{\phi_{|A}}{\longrightarrow} B$ est plat et ses fibres sont des espaces projectifs pondérés. Enfin, lorsque la contraction est de type fibrée, la variété Y est régulière et le morphisme ϕ est lisse.

Rappelons enfin un résultat général de J.Wisniewski ([W1], [W2]) sur le lieu exceptionnel d'une contraction extrémale. Soit F une composante irréductible d'une fibre non triviale d'une contraction élémentaire associée à la raie extrémale R. Nous appelons *lieu de R*, le lieu des courbes dont la classe d'équivalence numérique appartient à R. On a alors l'inégalité :

$$\mathrm{dim}F + \mathrm{dim}(\text{lieu de } R) \geq \mathrm{dim}X + \ell(R) - 1,$$

où $\ell(R)$ désigne la *longueur* de la raie extrémale R :

$$\ell(R) = \inf\{-K_X.C_0 | C_0 \text{ étant une courbe rationnelle et } C_0 \in R\}.$$

§3 Preuve du théorème

Lemme 1 *Soit Y une variété torique projective lisse de dimension n et $\mathcal{E}$ un fibré vectoriel de rang $r+1$ sur Y. On suppose que $X = \mathbb{P}_Y(\mathcal{E})$ est une variété torique et que le morphisme naturel $X \stackrel{\phi}{\longrightarrow} Y$ est équivariant.*

Alors le fibré $\mathcal{E}$ est totalement décomposé.

Démonstration Notons T le tore de dimension $n+r$ agissant sur X, $T^{'}$ le tore de dimension n agissant sur Y et $T \stackrel{\phi_*}{\longrightarrow} T^{'}$ le morphisme de groupes algébriques associé à ϕ. Les hypothèses faites entraînent que ce morphisme est surjectif. Notons N le noyau $N = \ker(\phi_*)$, c'est un groupe algébrique produit d'un tore $T^{''}$ de dimension r par un groupe fini.

Puisque X est une variété torique, le fibré $\mathcal{O}_X(1)$ est T-linéarisé et en particulier $T^{''}$-linéarisé. Le tore $T^{''}$ agissant trivialement sur Y, il en résulte facilement que le fibré $\mathcal{E}$ est $T^{''}$-linéarisé. Par suite, le fibré $\mathcal{E}$ est somme directe de ses composantes isotypiques :

$$\mathcal{E} = \oplus_{\chi \in X(T'')} \mathcal{E}_\chi$$

où $X(T^{''})$ désigne le groupe des caractères de $T^{''}$. Si l'un des fibrés vectoriels $\mathcal{E}_\chi$ est de rang supérieur où égal à deux, nous allons voir qu'un sous-tore non trivial de $T^{''}$ agit trivialement sur X, ce qui est impossible. Notons $\chi_1, \ldots, \chi_k$ $(k \geq 1)$ les caractères de $T^{''}$ intervenant dans la décomposition précédente et supposons que $k \leq r-1$. Considérons la composante neutre de l'intersection des noyaux de ces caractères. Par construction, l'action de ce tore sur le fibré $\mathcal{E}$ est triviale, ce qui est la conclusion souhaitée. ■

Lemme 2 *Soit X une variété torique projective lisse de dimension $n \geq 1$ dont le fibré tangent est totalement décomposé.*

Alors X est isomorphe à $\mathbb{P}^1 \times \ldots \times \mathbb{P}^1$.

Démonstration Notons Δ l'éventail définissant la variété torique X, T le tore agissant sur X et $N = \mathrm{Hom}_{gr.\,alg.}(\mathbb{G}_m, T)$. Par hypothèse, il existe des fibrés en droites $L_1, \ldots, L_n$ sur X tels que $\mathcal{T}_X = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$. Remarquons que le fibré tangent est naturellement linéarisé puisque, si $t \in T$, $d(t.)$ définit un automorphisme du fibré tangent à X. Par un résultat de A.A.Klyachko ([K] thm.1.2.3), on peut toujours supposer que l'isomorphisme précédent est équivariant, pour un choix convenable de linéarisations des fibrés L_i, $(1 \leq i \leq n)$.

Prenons $\sigma \in \Delta(n)$ et considérons l'ouvert U_σ qui lui est associé. Puisque la variété torique X est lisse, $\sigma = \mathbb{R}^+ e_{1,\sigma} + \ldots + \mathbb{R}^+ e_{n,\sigma}$ où $(e_{1,\sigma}, \ldots, e_{n,\sigma})$ est une base de N. Par définition $U_\sigma = \mathrm{Spec}(\mathbb{C}[M \cap \sigma^*])$, où $M = \mathrm{Hom}_{gr.\,alg.}(T, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(N, \mathbb{Z})$. Notons $(x_{1,\sigma}, \cdots, x_{n,\sigma})$ la base duale de $(e_{1,\sigma}, \ldots, e_{n,\sigma})$. Les $(x_{i,\sigma})_{1 \leq i \leq n}$ sont naturellement des caractères de T et forment un système de coordonnées locales sur U_σ. Nous notons φ_σ l'isomorphisme sur $\mathbb{C}^n$ ainsi obtenu. L'action du tore est alors donné par la formule $t.(x_{1,\sigma}, \ldots, x_{n,\sigma}) = (x_{1,\sigma}(t) x_{1,\sigma}, \cdots, x_{n,\sigma}(t) x_{n,\sigma})$. Aussi, les sections $s_{i,\sigma} = \varphi_\sigma^*(\partial_{x_{i,\sigma}}) \in H^0(U_\sigma, \mathcal{T}_X)$ sont semi-invariantes, engendrent le fibré tangent en tout point de U_σ et sont respectivement associées aux caractères $(x_{i,\sigma})_{1 \leq i \leq n}$. On vérifie enfin qu'une section du fibré tangent semi-invariante relativement à l'un des caractères $x_{i,\sigma}$ est multiple de la section $s_{i,\sigma}$ correspondante. On peut trouver pour chaque fibré L_i, une section qui soit semi-invariante sout T et qui engendre le fibré en tout point de U_σ. La somme directe de ces sections fournit donc une trivialisation du fibré $\mathcal{T}_X$ au dessus de l'ouvert U_σ qui est définie par n sections semi-invariantes. En évaluant ces sections en l'unique point fixe de U_σ, on vérifie que les caractères correspondants sont les $(x_{i,\sigma})_{1 \leq i \leq n}$. Il en résulte que chaque section $s_{i,\sigma}$ trivialise l'un des L_j. Par suite, l'image de la droite $\mathbb{C}^* s_{i,\sigma|U_{\sigma\sigma'}}$ $(1 \leq i \leq n)$ par la fonction de transition $\varphi_{\sigma'} \varphi_\sigma^{-1}$ est l'une des droites $\mathbb{C}^* s_{i,\sigma'|U_{\sigma\sigma'}}$ $(1 \leq i \leq n)$. Autrement dit, la ma-

trice associée à la fonction de transition $\varphi_{\sigma'}\varphi_\sigma^{-1}$ exprimée dans les bases $(s_{i,\sigma'}{}_{|U_{\sigma\sigma'}})_{1\leq i\leq n}$ et $(s_{i,\sigma}{}_{|U_{\sigma\sigma'}})_{1\leq i\leq n}$ n'a qu'un seul terme non nul par ligne et par colonne.

C'est ce résultat que nous allons maintenant exploiter. Considérons un cône $\tau \in \Delta(n-1)$ et soit σ et σ' les deux cônes de dimension n séparés par τ. Il existe donc une famille $(e_1, \ldots, e_{n-1})$ d'éléments de N et deux autres éléments de N, e_n et e_{n+1}, tels que les familles $(e_1, \cdots, e_{n-1}, e_n)$ et $(e_1, \ldots, e_{n-1}, e_{n+1})$ soient des bases de N et tels que l'on ait $\tau = \mathbb{R}^+e_1 + \cdots + \mathbb{R}^+e_{n-1}$, $\sigma = \tau + \mathbb{R}^+e_n$ et $\sigma' = \tau + \mathbb{R}^+e_{n+1}$. On a en outre une relation :

$$e_{n+1} + e_n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i e_i = 0,$$

où $\alpha_i \in \mathbb{Z}$. Notons $(x_1, \cdots, x_n)$ la base duale de la base $(e_1, \ldots, e_{n-1}, e_n)$ et $(z_1, \cdots, z_n)$ la base duale de la base $(e_1, \ldots, e_{n-1}, e_{n+1})$. Le changement de cartes est alors donné par la formule :

$$(z_1, \cdots, z_n) \mapsto (\frac{z_1}{z_n^{\alpha_1}}, \cdots, \frac{z_{n-1}}{z_n^{\alpha_{n-1}}}, \frac{1}{z_n}).$$

La fonction de transition $\varphi_{\sigma\sigma'}$ est donc donnée par la matrice :

$$\begin{pmatrix} z_n^{-\alpha_1} & 0 & \ldots & \ldots & 0 & -\alpha_1 z_1 z_n^{-\alpha_1-1} \\ 0 & z_n^{-\alpha_2} & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & z_n^{-\alpha_{n-1}} & -\alpha_{n-1} z_1 z_n^{-\alpha_{n-1}-1} \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & 0 & -z_n^{-2} \end{pmatrix}$$

Il en résulte les égalités $\alpha_1 = \ldots = \alpha_{n-1} = 0$ et donc $e_{n+1} = -e_n$.

Soit $e \in \Delta(1)$ et soit $\sigma \in \Delta(n)$ un cône dont e est une face de dimension 1. On identifie le cône e et l'élément primitif de N qui le détermine. Alors il existe une base $(e_1 = e, \ldots, e_n)$ de N telle que $\sigma = \mathbb{R}^+e_1 + \ldots + \mathbb{R}^+e_n$. Le cône $\mathbb{R}^+e_2 + \ldots + \mathbb{R}^+e_n$ est une face de dimension $n-1$ de σ et donc d'après ce qui précède, on a que $-e \in \Delta(1)$ et que le cône $\mathbb{R}^+(-e_1) + \ldots + \mathbb{R}^+e_n \in \Delta(n-1)$. Il en résulte que $\pm e_i \in \Delta(1)$ $(1 \leq i \leq n)$ et que tous les cônes possibles de dimension n formés sur ces vecteurs sont des cônes de l'éventail Δ. Si $e' \in \Delta(1)$, alors e' est contenu dans l'un des cônes précédents et donc e' est l'un des $(\pm e_i)_{1\leq i\leq n}$ et on a donc déterminé tous les cônes de dimension maximale, ce qui détermine Δ et termine la preuve du lemme. ■

Théorème *Soit X une variété torique projective lisse de dimension $2n+1$ $(n \geq 1)$ munie d'une structure de contact.*

Alors X est soit isomorphe à l'espace projectif complexe $\mathbb{P}^{2n+1}$, soit isomorphe à la variété $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1}(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1})$.

Démonstration La preuve de ce théorème repose sur l'étude des contractions extrémales de X. Notons T le tore agissant sur X. Puisque le diviseur canonique K_X de X n'est pas effectif, il existe une raie extrémale R au sens de Mori engendrée par une courbe rationnelle lisse C T-invariante. Puisque $K_X = -(n+1)L$, on a $\ell(R) = n+1$ ou $\ell(R) = 2n+2$, où $\ell(R)$ désigne la longueur de la raie extrémale R. Dans ce dernier cas, X est de Fano et $\text{Pic}(X) = \mathbb{Z}$ ([W1] prop. 2.4). Il en résulte que X est isomorphe à l'espace projectif

complexe $\mathbb{P}^{2n+1}$ ([O1] thm.7.1).

Il nous reste donc à étudier le cas où $\ell(R) = n + 1$. Notons $X \xrightarrow{\phi} Y$ la contraction de Mori associée à la raie R, où Y est une variété torique projective. Notons T' le tore agissant sur Y. Notons $A \subset X$ le lieu exceptionnel de ϕ et $B = \phi(X)$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\phi} & Y \\ \cup & & \cup \\ A & \xrightarrow{\phi_{|A}} & B \end{array}$$

Puisque la courbe C est T-invariante, elle est contractée sur un point fixe $y \in B$ sous T'. Le morphisme ϕ étant équivariant, la fibre $F = \phi^{-1}(y)$ au dessus de y est donc T-invariante. Par suite, puisque cette fibre est irréductible, on en déduit que F est une strate torique et donc que F est lisse puisque X l'est. La fibre F est donc isomorphe à un espace projectif $\mathbb{P}^k$ ($k \geq 1$) et, puisque C est une strate torique de la variété torique $\mathbb{P}^k$, il en résulte que la courbe C s'identifie à une droite de $\mathbb{P}^k$. Nous savons aussi qu'il existe une courbe rationnelle $C_1 \subset X$ telle que $C_1 \in R$ et $-K_X.C_1 = n + 1$. Mais, puisqu'il existe un diviseur D sur X tel que $D.C = 1$ et puisque $R = \mathbb{R}^+[C]$, il en résulte facilement que $C \equiv C_1$, de sorte que $C.L = 1$. Par suite, on a $(F, L_{|F}) = (\mathbb{P}^k, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^k}(1))$.

Puisque $H^0(\mathbb{P}^k, \Omega^1_{\mathbb{P}^k}(1)) = (0)$, la restriction de la forme de contact θ à $\mathbb{P}^k$ est nulle et on vérifie par un calcul en coordonnées locales que, pour tout $x \in \mathbb{P}^k$, le sous espace vectoriel $\mathcal{T}_{\mathbb{P}^k}(x) \subset D(x)$ est totalement isotrope pour la forme alternée de contact qui, par hypothèse est non-dégénérée. Il en résulte l'inégalité $k \leq n$ et donc l'égalité $k = n$ puisque $\dim F \geq \ell(R) - 1 = n$. Utilisant à nouveau l'inégalité de Wisniewski, on en déduit que la contraction est de type fibrée et donc que Y est régulière, de dimension $n + 1$ et que ϕ est lisse.

Considérons la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{T}_X \longrightarrow \phi^*\mathcal{T}_Y \longrightarrow 0$$

La flèche $\mathcal{T}_{X/Y} \longrightarrow L$ obtenue par composition avec la projection $\mathcal{T}_X \longrightarrow L$ étant identiquement nulle par le théorème de Grauert et les résultats ci-dessus, il existe une flèche surjective $\phi^*\mathcal{T}_Y \longrightarrow L \longrightarrow 0$ et donc un morphisme $X \longrightarrow \mathbb{P}_Y(\mathcal{T}_Y)$ au dessus de Y qui induit un isomorphisme sur chaque fibre. Il en résulte que ce morphisme est en fait un isomorphisme. Le résultat découle alors des lemmes 1 et 2. ■

Références

[B] A.Beauville, *Fano Contact Manifolds and Nilpotent Orbits*, Comment. Math. Helvet., à paraître.

[D] V.I.Danilov, *The geometry of toric varieties*, Russian Math. Surveys, 33, 97-154, 1978.

[F] W.Fulton, *Introduction to Toric Varieties*, Annals of Mathematics Studies, Princeton University Press, 131, 1993.

[K] A.A.Klyachko, *Equivariant Bundles on Toral Varieties*, Math. USSR Izv., 35, 337-375, 1990.

[L] C.Lebrun, *Fano manifolds, contact structures and quaternionic geometry*, Int. journ. of Math., 6, 419-437, 1995.

[M] S.Mori, *Threefolds whose canonical bundles are not numerically effective*, Ann. Math., 116, 133-176, 1982.

[O1] T.Oda, *Lectures on Torus Embeddings and Applications*, Tata Inst. of Fund. Research, 58, Springer, 1978.

[O2] T.Oda, *Convex Bodies and Algebraic Geometry*, 15, Springer-Verlag, 1988.

[R] M.Reid, *Decomposition of toric morphism*, dans *Arithmetic and Geometry, papers dedicated to I.R. Shafarevitch on the occasion of his 60th birthday*, Progress in Math. 36, Birkhaüser, 395-418, 1983.

[W1] J.Wisniewski, *Length of extremal rays and generalized adjonction*, Math. Z., 200, 409-427, 1989.

[W2] J.Wisniewski, *On contractions of extremal rays on Fano manifolds*, J. reine u. angew Math., 417, 141-157, 1991.

[Y] Y-G.Ye, *A note on complex projective threefolds admitting holomorphic contact structures*, Invent. Math., 121, 421-436, 1995.